

ESCALA DE AFECTACIÓN MIELOPÁTICA CERVICAL.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA JAPANESE ORTHOPAEDIC ASSOCIATION (JOA)



| | Puntuación |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| FUNCIÓN MOTRIZ DE EESS (Extremidades superiores) | |
| Incapaz de alimentarse solo | 0 |
| Incapaz de usar cuchillo y tenedor, pero capaz de usar la cuchara | 1 |
| Usa los cubiertos con mucha dificultad | 2 |
| Usa los cubiertos con poca dificultad | 3 |
| Sin alteraciones | 4 |
| FUNCIÓN MOTRIZ DE EEII (Extremidades inferiores) | |
| Incapaz de caminar | 0 |
| Necesita ayuda para caminar en suelo plano | 1 |
| Necesita utilizar el pasamanos al subir o bajar escalaras | 2 |
| Inestabilidad | 3 |
| Sin alteraciones | 4 |
| DÉFICIT SENSITIVO | |
| Extremidad superior | |
| Grave / Dolor | 0 |
| Leve | 1 |
| Sin déficit | 2 |
| Tronco | |
| Grave / Dolor | 0 |
| Leve | 1 |
| Sin déficit | 2 |
| Extremidad inferior | |
| Grave / Dolor | 0 |
| Leve | 1 |
| Sin déficit | 2 |
| FUNCIÓN VESICAL | |
| Nula | 0 |
| Dificultad miccional grave (retención ocasional) | 1 |
| Dificultad miccional leve (poliuria, urgencia urinaria) | 2 |
| Sin alteraciones | 3 |
| TOTAL | 0-17 |